

**REVISTA MENSUAL DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**ANEXO AL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS**

TOMO I

15 Julio 1907

NÚM. 5

TRABAJOS ORIGINALES

# LA QUELOTOMIA

en la Hernia Crural Extrangulada

por el

DOCTOR DON JOSÉ BLANC FORTACIN

Médico por oposición del Hospital de la Princesa de Madrid.

Esquematzada en los libros clásicos, apenas si hay un médico que no conozca teóricamente la operación de la hernia crural, que no sepa los peligros que en el desbridamiento del anillo existen en la extrangulación de esta hernia y que matemáticamente, con arreglo á principios bien sentados, no acierte á salvarlos. No es tan frecuente sin embargo, el que se comprenda cuan superficiales é incompletos son esos conocimientos para el tratamiento racional de un proceso que por aparecer á diario en la práctica corriente con caracteres graves, por episodios ocurridos en él que requieren intervención sin demora, bien merece que todos le conozcan en su verdadero aspecto.

Aparece la hernia crural en forma de entero epiplocele pequeño sin adquirir nunca las dimensiones enormes de algunas inguinales. Es frecuentísimo que á pesar de su pequeñez, en breve plazo se haga irreductible y moleste á la enferma (generalmente como es sabido es propio del sexo femenino) á diferencia de esos enterocèles que se ven en los