

REVISTA MENSUAL DE CIENCIAS MÉDICAS
REVISTA MENSUAL DE CIENCIAS MÉDICAS
REVISTA MENSUAL DE CIENCIAS MÉDICAS

TOMO I

15 Mayo 1907

NÚM. 3

TRABAJOS ORIGINALES

UNA NOTA SOBRE EL METODO DE THIERSCH
PARA EL TRATAMIENTO DEL
PROLAPSO RECTAL

Entre los métodos terapéuticos radicales del prolapso rectal, la resección del recto, con la técnica perfeccionada por el profesor Mikulicz, es el más empleado, pero también el más cruento y grave, y algunos enfermos, por su edad avanzada ó por padecer lesiones internas, no están en condiciones de soportarlos. En estos casos y en los prolapsos rectales rebeldes de los niños, es preciso acudir á otras operaciones menos cruentas, pero de manifiesta eficacia; con la cauterización de la mucosa del recto prolapsada se consiguen algunas curaciones, pero en otros casos el prolapso se reproduce. Mejores resultados se obtienen con el estrechamiento del orificio anal mediante la operación de Kehrer ó por el empleo del anillo de Thiersch.

El deseo de proclamar las ventajas, sencillez é inocuidad de este último método, me han movido á publicar esta nota clínica.

Claro es que no todos los casos de prolapso rectal pueden tratarse por el anillo de Thiersch debiendo excluirse los irreductibles, los gangrenados y los prolapsos del colon invaginado. Por otra parte, si la mucosa del prolapso se halla alterada por una extensa y profunda ulceración, el método